

Livret d'information

Mesdames, Messieurs

Le CCA vous propose un petit rappel sur les médicaments que vous pourriez avoir à prendre...

Ce rappel est à titre d'information.

Nous vous rappelons qu'il faut toujours vous fier à votre prescription médicale (en cas d'ordonnance) ou aux conseils de votre médecin et/ou pharmacien (en cas d'automédication).

Nous vous conseillons également de lire la notice avant chaque prise de médicament.

Ne laisser jamais les médicaments à portée de vos enfants.

PARACETAMOL :

Nom commercial : Dafalgan, Doliprane, Efferalgan, etc...

Indications : Traitement des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou des états fébriles (fièvre).

Contre-indications :

- Allergie au paracétamol ou l'un des excipients.
- Insuffisance hépatocellulaire (cellules du foie).

Effets-indésirables :

- Aucuns, hormis des réactions d'hypersensibilités (érythème, urticaire, rush cutané...).

TRAMADOL :

Nom commercial : Contramal, Topalgic, Oromaxamol, etc...

Indications : Traitement des douleurs modérées à sévères.

Contre-indications :

- Allergie au tramadol ou à l'un des excipients.
- Intoxications aiguës par l'alcool, les hypnotiques, les analgésiques, les opioïdes ou autres psychotropes.
- Patients épileptiques non contrôlés par un traitement.

- Sevrage des toxicomanies.

Effets-indésirables :

- Nausées, vomissement, sueurs.
- Vertiges, céphalées (maux de tête), somnolence.
- Sècheresse de la bouche

DEBRIDAT (Trimébutine) :

Nom commercial : Débridat.

Indications : Ce médicament est indiqué dans les douleurs liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires.

Ainsi que des douleurs liées aux troubles du transit et de l'inconfort intestinal liés aux troubles fonctionnels intestinaux.

Contre-indications :

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients (voir notice).
- Hypersensibilité au gluten, lactose et fructose.

Effets-indésirables :

- Réactions cutanéomuqueuses et allergiques (érythème, urticaire, rush cutané...).

IBUPROFENE :

Nom commercial : Advil, Nurofen, Brufen, etc...

Indications : L'ibuprofène est un anti-inflammatoire utilisé dans le traitement des douleurs légères à modérées, dans les états fébriles (fièvre) et dans le traitement de certaines maladies rhumatismales.

Contre-indications :

- Allergie à l'ibuprofène ou l'un des excipients.
- Grossesse.
- Troubles digestifs à type d'ulcère, antécédents d'hémorragie ou perforation digestive, hémorragie gastro-intestinale.
- Insuffisance : hépatique sévère (foie), cardiaque sévère (cœur), rénale sévère (rein).
- Antécédents d'asthme déclenché par la prise d'ibuprofène.

Effets-indésirables :

- Effets gastro-intestinaux (nausées, vomissements, gastralgie, troubles du transit...).
- Réaction d'hypersensibilité (allergie).

SPASFON (Phloroglucinol):

Nom commercial : Spasfon, Spasmocalm, etc...

Indications : Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spasmodiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

Contre-indications :

Hypersensibilité à l'un des composants (voir notice).

Effets-indésirables :

- Réactions cutanéomuqueuses et allergiques (érythème, urticaire, rush cutané...).